

### §3.6 いくつかの関数の導関数

指数関数の導関数は次のようになります。

**定理 3.6.1** 定数  $a$  は実数で  $a > 0$ ,  $a \neq 1$  のとき,  $a$  を底とする指数関数  $a^x$  の導関数は

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a .$$

特に, 自然対数の底  $e$  に対して, 指数関数  $e^x$  の導関数は

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x .$$

**証明**  $y = a^x$  とおく.  $\frac{d}{dx}a^x = \frac{dy}{dx}$  を求める.  $y = a^x$  の自然対数をとると,

$$\ln y = \ln a^x = x \ln a .$$

この等式の両辺を  $x$  で微分する:

$$\frac{d}{dx} \ln y = \frac{d}{dx}(x \ln a) . \quad (1)$$

この等式 (1) の左辺は, 定理 3.5 より

$$\frac{d}{dx} \ln y = \frac{d}{dy} \ln y \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} ;$$

$\ln a$  は定数なので, 等式 (1) の右辺は

$$\frac{d}{dx}(x \ln a) = \ln a \cdot \frac{d}{dx}x = \ln a \cdot 1 = \ln a ;$$

従って  $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \ln a$  なので,

$$\frac{dy}{dx} = y \ln a .$$

$y = a^x$  なので,  $\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a$  .

特に,  $a = e$  のとき,  $\ln e = \log_e e = 1$  なので,

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x \ln e = e^x \cdot 1 = e^x .$$

(証明終り)

**例題** 実数全体を定義域とする関数  $g$  を  $g(x) = 3^x \sin x$  と定める. 関数  $g$  の導関数  $g'$  を求める.

$$\frac{d}{dx}3^x = 3^x \ln 3 \text{ なので,}$$

$$g'(x) = \frac{d}{dx}g(x) = \frac{d}{dx}(3^x \sin x) = \frac{d}{dx}3^x \cdot \sin x + 3^x \cdot \frac{d}{dx} \sin x = 3^x \ln 3 \sin x + 3^x \cos x = 3^x (\ln 3 \sin x + \cos x) . \quad \text{終}$$

**問題 3.6.1** 実数全体を定義域とする関数  $f$  を  $g(x) = 2^x \cos x$  と定める. 関数  $f$  の導関数  $f'$  を求めなさい.

**例題** 変数  $x$  の関数  $y = \frac{x^3}{5^x}$  を微分しなさい.

$$\frac{d}{dx}5^x = 5^x \ln 5 \text{ なので,}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \frac{x^3}{5^x} = \frac{\frac{d}{dx}x^3 \cdot 5^x - x^3 \frac{d}{dx}5^x}{(5^x)^2} = \frac{3x^2 5^x - x^3 5^x \ln 5}{(5^x)^2} \\ &= \frac{3x^2 - x^3 \ln 5}{5^x} . \end{aligned} \quad \text{終}$$

**問題 3.6.2** 変数  $x$  の関数  $y = \frac{\sin x}{3^x}$  を微分しなさい.

**例題** 変数  $x$  の関数  $y = e^{2x-3}$  を微分する.

$$t = 2x - 3 \text{ とおく. } y = e^{2x-3} = e^t \text{ なので,}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}e^t = \frac{d}{dt}e^t \cdot \frac{dt}{dx} = e^t \cdot \frac{d}{dx}(2x - 3) = e^{2x-3} \cdot 2 \\ &= 2e^{2x-3} . \end{aligned} \quad \text{終}$$

**問題 3.6.3** 変数  $u$  の関数  $v = e^{5-3u}$  を微分しなさい.

実数を指数とする冪関数の導関数は次のようになります。

**定理 3.6.2** 実数  $p$  を指数とする冪関数  $x^p$  の導関数は

$$\frac{d}{dx}x^p = px^{p-1} \quad (x > 0) .$$

**証明**  $y = x^p$  ( $x > 0$ ) とおく.  $\frac{d}{dx}x^p = \frac{dy}{dx}$  を求める.  $y = x^p$  の自然対数をとると,

$$\ln y = \ln x^p = p \ln x .$$

この等式の両辺を  $x$  で微分する:

$$\frac{d}{dx} \ln y = \frac{d}{dx}(p \ln x) . \quad (2)$$

この等式 (2) の左辺は, 定理 3.5 より

$$\frac{d}{dx} \ln y = \frac{d}{dy} \ln y \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} ;$$

$p$  は定数なので, 等式 (2) の右辺は,

$$\frac{d}{dx}(p \ln x) = p \frac{d}{dx} \ln x = p \frac{1}{x} ;$$

従って  $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = p \frac{1}{x}$  なので,

$$\frac{dy}{dx} = p \frac{y}{x} .$$

$y = x^p$  なので,  $\frac{d}{dx}x^p = p \frac{x^p}{x} = px^{p-1}$  .

(証明終り)

冪関数の微分公式を並べてみます。

定理 3.1.1: 定数  $n$  が正の整数であるとき  $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$  ;

定理 3.4.3: 定数  $n$  が整数であるとき  $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$  ( $x \neq 0$ ) ;

定理 3.6.2: 定数  $p$  が実数であるとき  $\frac{d}{dx}x^p = px^{p-1}$  ( $x > 0$ ) .

冪関数の指数の範囲が広がると独立変数  $x$  の値の範囲は狭くなります。

**例題** 変数  $x$  の関数  $\sqrt[3]{x^2}$ ,  $\frac{3}{\sqrt{x}}$  を微分する.

$$\frac{d}{dx}\sqrt[3]{x^2} = \frac{d}{dx}x^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1} = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} .$$

$$\frac{d}{dx}\frac{3}{\sqrt{x}} = 3 \frac{d}{dx}x^{-\frac{1}{2}} = 3 \left(-\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}-1}\right) = -\frac{3}{2}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{3}{2}\frac{1}{\sqrt{x^3}} = -\frac{3}{2x\sqrt{x}} . \quad \text{終}$$

**問題 3.6.4** 変数  $x$  の関数  $\sqrt{x^3}$  を微分しなさい.

**問題 3.6.5** 変数  $x$  の関数  $\frac{6}{\sqrt[3]{x}}$  を微分しなさい.

**例題** 変数  $y$  の関数  $z = \sqrt{y^2 - 3y + 5}$  を微分する.

$t = y^2 - 3y + 5$  とおく.  $z = \sqrt{y^2 - 3y + 5} = \sqrt{t} = t^{\frac{1}{2}}$  なので, 定理 3.5 を用いると,

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dy} &= \frac{d}{dy}t^{\frac{1}{2}} = \frac{d}{dt}t^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{dt}{dy} = \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{d}{dy}(y^2 - 3y + 5) = \frac{1}{2\sqrt{t}}(2y - 3) \\ &= \frac{2y - 3}{2\sqrt{y^2 - 3y + 5}} . \end{aligned} \quad \text{終}$$

**問題 3.6.6** 変数  $y$  の関数  $z = \sqrt{3y^2 - 5y + 4}$  を微分しなさい.

**例題** 区間  $\left[-\frac{5}{4}, \infty\right)$  を定義域とする関数  $f$  を  $f(x) = \sqrt{5x+1}^3$  と定める. 7 における  $f$  の微分係数を求める.

変数  $t$  を  $t = 5x+1$  とおく.  $f(x) = \sqrt{5x+1}^3 = \sqrt{t}^3 = t^{\frac{3}{2}}$  なので,  $f$  の導関数  $f'$  は

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}f(x) = \frac{d}{dx}t^{\frac{3}{2}} = \frac{d}{dt}t^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{3}{2}t^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{d}{dx}(5x+1) = \frac{3}{2}\sqrt{t} \cdot 5 \\ &= \frac{15}{2}\sqrt{5x+1} . \end{aligned}$$

7 における  $f$  の微分係数は

$$f'(7) = \frac{15}{2}\sqrt{5 \cdot 7 + 1} = \frac{15}{2}\sqrt{36} = \frac{15}{2} \cdot 6 = 45 . \quad \text{終}$$

**問題 3.3.7** 区間  $\left[\frac{5}{6}, \infty\right)$  を定義域とする関数  $g$  を  $g(x) = \sqrt{6x-5}^3$  と定めます. 9 における  $g$  の微分係数を求めなさい.

最後に, 定理 3.1.3 を拡張します。

**定理 3.6.3** 関数  $\ln|x|$  ( $x \neq 0$ ) の導関数は

$$\frac{d}{dx} \ln|x| = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0) .$$

**証明**  $x \neq 0$  なので,  $x > 0$  または  $x < 0$ .  $x > 0$  のときは,  $|x| = x$  なので,

$$\frac{d}{dx} \ln|x| = \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x} .$$

$x < 0$  のときは,  $y = -x$  とおくと,  $|x| = -x = y$  なので, 定理 3.5 より

$$\frac{d}{dx} \ln|x| = \frac{d}{dx} \ln y = \frac{d}{dy} \ln y \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} \frac{d}{dx}(-x) = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x} .$$

故に, どちらのときも  $\frac{d}{dx} \ln|x| = \frac{1}{x}$  . (証明終り)

**例題** 変数  $y$  の関数  $z = \ln|y^3 + 2|$  を微分する.

$$t = y^3 + 2 \text{ とおく. } z = \ln|y^3 + 2| = \ln|t| \text{ なので,}$$

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dy} &= \frac{d}{dy} \ln|t| = \frac{d}{dt} \ln|t| \cdot \frac{dt}{dy} = \frac{1}{t} \cdot \frac{d}{dy}(y^3 + 2) = \frac{1}{y^3 + 2} 3y^2 \\ &= \frac{3y^2}{y^3 + 2} . \end{aligned} \quad \text{終}$$

**問題 3.6.8** 変数  $x$  の関数  $y = \ln|\cos x|$  を微分しなさい.