§1.5　等比数列

数列 $\{a_n\}$ について，漸化式

$$a_n = ra_{n-1} \qquad (r \text{ は変数 } n \text{ と無関係な定数})$$

が成り立つとき，数列 $\{a_n\}$ を**等比数列**といい，定数 r をその**公比**といいます.

例　等比数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ について公比は 2 であり $a_3 = 10$ とします. 正の各自然数 n について $a_n = 2a_{n-1}$ なので,

$$a_n = 2a_{n-1} \text{ において } n = 4 \text{ とすると } a_4 = 2a_3 = 2\times 10 = 20 \ ,$$
$$a_n = 2a_{n-1} \text{ において } n = 5 \text{ とすると } a_5 = 2a_4 = 2\times 20 = 40 \ ,$$
$$a_n = 2a_{n-1} \text{ において } n = 6 \text{ とすると } a_6 = 2a_5 = 2\times 40 = 80 \ ,$$
$$a_n = 2a_{n-1} \text{ において } n = 7 \text{ とすると } a_7 = 2a_6 = 2\times 80 = 160 \ ,$$
$$\vdots \ .$$

また，正の各自然数 n について $a_{n-1} = \dfrac{a_n}{2}$ なので,

$$a_{n-1} = \frac{a_n}{2} \text{ において } n = 3 \text{ とすると } a_2 = \frac{a_3}{2} = \frac{10}{2} = 5 \ ,$$
$$a_{n-1} = \frac{a_n}{2} \text{ において } n = 2 \text{ とすると } a_1 = \frac{a_2}{2} = \frac{5}{2} \ ,$$
$$a_{n-1} = \frac{a_n}{2} \text{ において } n = 1 \text{ とすると } a_0 = \frac{a_1}{2} = \frac{5}{4} \ . \qquad \text{終}$$

等比数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ の公比を r とおきます. 漸化式 $a_n = a_{n-1}r$ を用いて，自然数 m に対する項 a_m から $a_{m+1}, a_{m+2}, a_{m+3}, a_{m+4}, \ldots$ を計算していくと,

$$a_{m+1} = a_m r = a_m r^1 \ ,$$
$$a_{m+2} = a_{m+1}r = a_m r\cdot r = a_m r^2 \ ,$$
$$a_{m+3} = a_{m+2}r = a_m r^2\cdot r = a_m r^3 \ ,$$
$$a_{m+4} = a_{m+3}r = a_m r^3\cdot r = a_m r^4 \ ,$$
$$a_{m+5} = a_{m+4}r = a_m r^4\cdot r = a_m r^5 \ ,$$
$$\vdots \qquad .$$

このように，各自然数 k に対して $a_{m+k} = a_m r^k$.

$$\begin{array}{ccccccccccccc} a_m & \xrightarrow{\times r} & a_{m+1} & \xrightarrow{\times r} & a_{m+2} & \xrightarrow{\times r} & a_{m+3} & \xrightarrow{\times r} & a_{m+4} & \xrightarrow{\times r} & \cdots & \xrightarrow{\times r} & a_{m+k} \\ & & \| & & \| & & \| & & \| & & & & \| \\ & & a_m r & & a_m r^2 & & a_m r^3 & & a_m r^4 & & \cdots & & a_m r^k \end{array} \ .$$

この等式 $a_{m+k} = a_m r^k$ において $m+k = n$ とおきます; $k = n-m$ なので, $a_n = a_m r^{n-m}$.

定理 1.5.1　等比数列 $\{a_n\}$ の公比が r であるとき，数列 $\{a_n\}$ の定義域の各自然数 m, n について $a_n = a_m r^{n-m}$.

実数 x が自然数でないとき，例えば $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^x$ のような，底が負の数で指数が x である冪は定義されていません（指数関数の底は正の実数に限られます）. しかし，数列 $\{a_n\}$ の独立変数 n の値は自然数に限られますから，$\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n$ のような負の数を底とする冪の値があります:

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^0 = 1 \ , \ \left(-\frac{2}{3}\right)^1 = -\frac{2}{3} \ , \ \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \ , \ \left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27} \ , \ \cdots \ .$$

従って，例えば公比が $-\dfrac{2}{3}$ である等比数列 $\left\{\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n\right\}_{n\geq 0}$ ができます.

例題　等比数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ について公比は 2 であり $a_5 = 28$ とする. 各自然数 n に対する項 a_n を n の式で表す.

等比数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ の公比は 2 なので,

$$a_n = a_5 2^{n-5} = 28\cdot 2^{n-5} = 7\cdot 2^2\cdot 2^{n-5} = 7\cdot 2^{n-3} \ . \qquad \text{終}$$

問題 1.5.1　等比数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ について公比は $\dfrac{1}{3}$ であり $a_2 = 45$ とします. 各自然数 n に対する項 a_n を n の式で表しなさい.

例題　等比数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ について，公比は正の実数であり，$a_2 = 7$ かつ $a_6 = 63$ とする. 各自然数 n に対する項 a_n を n の式で表す.

等比数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ の公比を r とおく. $a_6 = a_2 r^{6-2}$ なので, $63 = 7r^4$, $r^4 = 9$, $r > 0$ なので

$$r = 9^{\frac{1}{4}} = (3^2)^{\frac{1}{4}} = 3^{\frac{1}{2}} \ .$$

従って,

$$a_n = a_2 r^{n-2} = 7\cdot\left(3^{\frac{1}{2}}\right)^{n-2} = 7\cdot 3^{\frac{n}{2}-1} \ . \qquad \text{終}$$

問題 1.5.2　等比数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ について，公比は正の実数であり，$a_3 = 4$ かつ $a_{12} = 500$ とします. 各自然数 n に対する項 a_n を n の式で表しなさい.

等比数列の項の総和の計算法を説明します.

例解　自然 n に対して，公比が 5 である等比数列の項の総和

$$\sum_{k=0}^{n}(2\cdot 5^k) = 2+10+50+250+1250+\cdots+2\cdot 5^{n-1}+2\cdot 5^n$$

を求めます. この値を S とおきます:

$$S = 2+10+50+250+1250+\cdots+2\cdot 5^{n-2}+2\cdot 5^{n-1}+2\cdot 5^n \ .$$

この等式の両辺に公比 5 を掛けます:

$$\begin{aligned} 5S &= (2+10+50+250+1250+\cdots+2\cdot 5^{n-2}+2\cdot 5^{n-1}+2\cdot 5^n)\cdot 5 \\ &= 2\cdot 5+10\cdot 5+50\cdot 5+250\cdot 5+1250\cdot 5+\cdots+2\cdot 5^{n-2}\cdot 5+2\cdot 5^{n-1}\cdot 5+2\cdot 5^n\cdot 5 \\ &= 10+50+250+1250+6250+\cdots 2\cdot 5^{n-1}+2\cdot 5^n+2\cdot 5^{n+1} \ . \end{aligned}$$

$5S$ から S を引くと次のように $10+50+250+1250+6250+\cdots+2\cdot 5^{n-1}+2\cdot 5^n$ の部分が無くなります.

$$\begin{array}{rrcl} & 5S &= & 10+50+250+1250+6250+\quad\cdots\quad+2\cdot 5^{n-1}+2\cdot 5^n+2\cdot 5^{n+1} \\ -) & S &= & 2+10+50+250+1250+\ \cdots\ +2\cdot 5^{n-2}+2\cdot 5^{n-1}+2\cdot 5^n \\ \hline & 4S &= & -2 \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad +2\cdot 5^{n+1} \end{array}$$

つまり $4S = -2+2\cdot 5^{n+1} = 2\cdot 5^{n+1}-2$ なので, $S = \dfrac{1}{2}(5^{n+1}-1)$. よって

$$\sum_{k=0}^{n}(2\cdot 5^k) = 2+10+50+250+1250+\cdots+2\cdot 5^{n-1}+2\cdot 5^n = \frac{1}{2}(5^{n+1}-1) \ . \qquad \text{終}$$

例題　2 以上の自然数 n に対して等比数列の項の総和 $\sum_{k=2}^{n}(5\cdot 3^k)$ を計算する.

〔解説〕 $S = \sum_{k=2}^{n}(5\cdot 3^k)$ とおく.

$$S = 5\cdot 3^2+5\cdot 3^3+5\cdot 3^4+5\cdot 3^5+5\cdot 3^6+\cdots+5\cdot 3^{n-1}+5\cdot 3^n \ .$$

両辺に等比数列の公比 3 を掛ける:

$$3S = 5\cdot 3^3+5\cdot 3^4+5\cdot 3^5+5\cdot 3^6+5\cdot 3^7+\cdots+5\cdot 3^n+5\cdot 3^{n+1} \ .$$

$3S$ から S を引く:

$$\begin{array}{rrcl} & 3S &= & 5\cdot 3^3+5\cdot 3^4+5\cdot 3^5+\cdots+5\cdot 3^{n-1}+5\cdot 3^n+5\cdot 3^{n+1} \\ -) & S &= & 5\cdot 3^2+5\cdot 3^3+5\cdot 3^4+5\cdot 3^5+\cdots+5\cdot 3^{n-1}+5\cdot 3^n \\ \hline & 2S &= & -5\cdot 3^2 \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad +5\cdot 3^{n+1} \end{array}$$

つまり $2S = -5\cdot 3^2+5\cdot 3^{n+1} = 5\cdot 3^{n+1}-45$. よって $S = \dfrac{5\cdot 3^{n+1}-45}{2}$. 故に $\sum_{k=0}^{n}(5\cdot 3^k) = \dfrac{5\cdot 3^{n+1}-45}{2}$. 終

問題 1.5.3　3 以上の自然数 n に対して等比数列の項の総和 $\sum_{k=3}^{n}(8\cdot 5^k)$ を計算しなさい.

例題　自然数 n に対して等比数列の項の総和 $\sum_{k=0}^{n}\left\{3\left(\dfrac{5}{7}\right)^k\right\}$ を計算する.

〔解説〕 $S = \sum_{k=0}^{n}\left\{3\left(\dfrac{5}{7}\right)^k\right\}$ とおく:

$$S = 3+3\cdot\frac{5}{7}+3\left(\frac{5}{7}\right)^2+3\left(\frac{5}{7}\right)^3+\cdots+3\left(\frac{5}{7}\right)^{n-1}+3\left(\frac{5}{7}\right)^n \ .$$

この等式の両辺に等比数列の公比 $\dfrac{5}{7}$ を掛ける:

$$\frac{5}{7}S = 3\cdot\frac{5}{7}+3\left(\frac{5}{7}\right)^2+3\left(\frac{5}{7}\right)^3+3\left(\frac{5}{7}\right)^4+\cdots+3\left(\frac{5}{7}\right)^n+3\left(\frac{5}{7}\right)^{n+1} \ .$$

S から $\dfrac{5}{7}S$ を引く:

$$\begin{array}{rrcl} & S &= & 3+3\cdot\frac{5}{7}+3\left(\frac{5}{7}\right)^2+3\left(\frac{5}{7}\right)^3+3\left(\frac{5}{7}\right)^4+\cdots+3\left(\frac{5}{7}\right)^n \\ -) & \frac{5}{7}S &= & \quad 3\cdot\frac{5}{7}+3\left(\frac{5}{7}\right)^2+3\left(\frac{5}{7}\right)^3+3\left(\frac{5}{7}\right)^4+\cdots+3\left(\frac{5}{7}\right)^n+3\left(\frac{5}{7}\right)^{n+1} \\ \hline & \frac{2}{7}S &= & 3 \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad -3\left(\frac{5}{7}\right)^{n+1} \end{array}$$

つまり $\dfrac{2}{7}S = 3-3\left(\dfrac{5}{7}\right)^{n+1}$. 両辺に $\dfrac{7}{2}$ を掛けて

$$S = 3\cdot\frac{7}{2}-3\cdot\frac{7}{2}\left(\frac{5}{7}\right)^{n+1} = \frac{21}{2}-3\cdot\frac{7}{2}\cdot\frac{5}{7}\left(\frac{5}{7}\right)^n = \frac{21}{2}-\frac{15}{2}\left(\frac{5}{7}\right)^n \ .$$

つまり $\sum_{k=0}^{n}\left\{3\left(\dfrac{5}{7}\right)^k\right\} = \dfrac{21}{2}-\dfrac{15}{2}\left(\dfrac{5}{7}\right)^n$.

$S = \sum_{k=0}^{n}\left\{3\left(\dfrac{5}{7}\right)^k\right\}$ に公比 $\dfrac{5}{7}$ の逆数 $\dfrac{7}{5}$ を掛けてもよい.

$$S = 3+3\cdot\frac{5}{7}+3\left(\frac{5}{7}\right)^2+3\left(\frac{5}{7}\right)^3+\cdots+3\left(\frac{5}{7}\right)^{n-1}+3\left(\frac{5}{7}\right)^n \ .$$
$$\frac{7}{5}S = 3\cdot\frac{7}{5}+3+3\cdot\frac{5}{7}+3\left(\frac{5}{7}\right)^2+\cdots+3\left(\frac{5}{7}\right)^{n-2}+3\left(\frac{5}{7}\right)^{n-1} \ .$$

$\dfrac{7}{5}S$ から S を引く.

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{7}{5}S &= & 3\cdot\frac{7}{5}+3+3\cdot\frac{5}{7}+3\left(\frac{5}{7}\right)^2+3\left(\frac{5}{7}\right)^3+\cdots+3\left(\frac{5}{7}\right)^{n-1} \\ -) & S &= & \quad 3+3\cdot\frac{5}{7}+3\left(\frac{5}{7}\right)^2+3\left(\frac{5}{7}\right)^3+\cdots+3\left(\frac{5}{7}\right)^{n-1}+3\left(\frac{5}{7}\right)^n \\ \hline & \frac{2}{5}S &= & 3\cdot\frac{7}{5} \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad -3\left(\frac{5}{7}\right)^n \end{array}$$

つまり $\dfrac{2}{5}S = 3\cdot\dfrac{7}{5}-3\left(\dfrac{5}{7}\right)^n$. 両辺に $\dfrac{5}{2}$ を掛けて $S = \dfrac{21}{2}-\dfrac{15}{2}\left(\dfrac{5}{7}\right)^n$. つまり $\sum_{k=0}^{n}\left\{3\left(\dfrac{5}{7}\right)^k\right\} = \dfrac{21}{2}-\dfrac{15}{2}\left(\dfrac{5}{7}\right)^n$. 終

問題 1.5.4　正の自然数 n に対して総和 $\sum_{k=1}^{n}\left\{4\left(\dfrac{3}{5}\right)^k\right\}$ を計算しなさい.

等比数列の項の総和について次の公式があります.

定理 1.5.2　正の自然数 n に対して，最初の項が a であり公比が r である等比数列の初めの n 個の項の総和は，$r \neq 1$ のとき

$$a+ar+ar^2+ar^3+ar^4+\cdots+ar^{n-2}+ar^{n-1} = \frac{a(r^n-1)}{r-1} = \frac{a(1-r^n)}{1-r} \ ,$$

$r = 1$ のとき

$$a+ar+ar^2+ar^3+ar^4+\cdots+ar^{n-2}+ar^{n-1} = an \ .$$

証明　$r \neq 1$ とする. 最初の項が a であり公比が r である等比数列の初め n 個の項の総和を S_n とおく:

$$S_n = a+ar+ar^2+ar^3+ar^4+\cdots+ar^{n-2}+ar^{n-1} \ .$$

両辺に公比 r を掛けると

$$rS_n = ar+ar^2+ar^3+ar^4+\cdots+ar^{n-2}+ar^{n-1}+ar^n \ .$$

S_n から rS_n を引くと,

$$\begin{aligned} S_n - rS_n &= a+ar+ar^2+ar^3+ar^4+\cdots+ar^{n-2}+ar^{n-1} \\ &\quad -(ar+ar^2+ar^3+ar^4+\cdots+ar^{n-2}+ar^{n-1}+ar^n) \\ &= a-ar^n \ , \end{aligned}$$

よって $(1-r)S_n = a(1-r^n)$ なので, $S_n = \dfrac{a_1(1-r^n)}{1-r}$.

$r = 1$ のとき,

$$a+ar+ar^2+ar^3+ar^4+\cdots+ar^{n-2}+ar^{n-1} = \underbrace{a+a+a+a+a+\cdots+a+a}_{n \text{ 個の } a \text{ の和}}$$
$$= an \ .$$

（証明終り）

例　正の自然数 n に対して，初項が 5 であり公比が 3 である等比数列の初項から第 n 項までの n 個の項の総和は

$$5+5\cdot 3+5\cdot 3^2+5\cdot 3^3+\cdots+5\cdot 3^{n-1} = \frac{5(3^n-1)}{3-1} = \frac{5}{2}(3^n-1) \ . \qquad \text{終}$$

例題　正の自然数 n に対して総和 $\sum_{k=1}^{n}\left\{4\left(\dfrac{3}{5}\right)^k\right\}$ を計算する.

総和 $\sum_{k=1}^{n}\left\{4\left(\dfrac{3}{5}\right)^k\right\}$ は，初項が $4\left(\dfrac{3}{5}\right)^1 = \dfrac{12}{5}$ であり公比が $\dfrac{3}{5}$ である等比数列の初項から第 n 項までの n 個の項の総和である.

$$\sum_{k=1}^{n}\left\{4\left(\frac{3}{5}\right)^k\right\} = \frac{\frac{12}{5}\left\{1-\left(\frac{3}{5}\right)^n\right\}}{1-\frac{3}{5}} = 6\left\{1-\left(\frac{3}{5}\right)^n\right\} \ . \qquad \text{終}$$

問題 1.5.5　正の自然数 n に対して総和 $\sum_{k=1}^{n}\left\{6\left(\dfrac{5}{3}\right)^k\right\}$ を計算しなさい.

例題　正の自然数 n に対して等比数列の項の総和 $2+10+50+250+1250+\cdots+2\cdot 5^n$ を計算する.

〔解説〕 総和

$$\begin{aligned} 2+10+50+250+1250+\cdots+2\cdot 5^n &= 2+2\cdot 5^1+2\cdot 5^2+2\cdot 5^3+2\cdot 5^4+\cdots+2\cdot 5^n \\ &= \sum_{k=0}^{n}(2\cdot 5^k) \end{aligned}$$

は，第 0 項が 2 であり公比が 5 である等比数列の第 0 項から第 n 項までの $(n+1)$ 個の項の総和である.

$$2+10+50+250+1250+\cdots+2\cdot 5^n = \frac{2(5^{n+1}-1)}{5-1} = \frac{1}{2}(5^{n+1}-1) \ . \qquad \text{終}$$

問題 1.5.6　正の自然数 n に対して総和 $4+12+36+108+324+\cdots+4\cdot 3^n$ を計算しなさい.